

Évaluation MÉDICALE de la pertinence de l'

arrêt
de
travail

Étapes de l'évaluation menant à un arrêt de travail de plus d'une semaine

Consultation médicale avec ou sans rendez-vous	Deuxième consultation médicale	Outils d'évaluation
Évaluation médicale et prescription d'un arrêt de travail d'une ou deux semaines et d'un traitement pharmacologique si nécessaire	<p>Rencontre entre le médecin et le patient visant une entente partagée concernant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La pertinence de l'arrêt; ● La durée de l'arrêt; ● Le plan d'arrêt proposé : <ol style="list-style-type: none"> a. Médication; b. Le suivi conjoint avec un ou des professionnels; c. Les modalités du suivi médical. ● Modalités de remise des formulaires. 	<p>Avantages et inconvénients de l'AT</p> <p>Diagnostic différentiel</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PHQ-9 ● Maslach ● Inventaire de Burns ou GAD-7 <p>Capacités fonctionnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Whodas ● Leaps ● Grille symptômes dépressifs versus l'atteinte fonctionnelle
	Encourager le patient à entrer en contact avec son milieu de travail et les ressources disponibles pour le soutenir durant son arrêt (ex. : service santé, délégué syndical, etc.).	Informier le patient des ressources auxquelles il peut avoir recours : PAE, services publics ou privés, etc.

Sylvie Bradette, Cynthia Cameron, Annie Plamondon et Anny Veillette; DMFMU, Université Laval, 2016, mis à jour 2018.